



**FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU**

FMC Chemical S.P.R.L
rue Royale 97
1000 Bruxelles

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van Verordening (EG) nr.1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en meer bepaald art. 53 betreffende afwijkingen in noodsituaties op het gebied van gewasbescherming, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, wordt het product:

EXIREL

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten

als: insecticide

voor: professioneel gebruik

op naam van: FMC Chemical S.P.R.L

2. Samenstelling en vorm

2.1. Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: 100 g/l cyantraniliprole

2.2. Formuleringstype: SE (Suspo-emulsie)

3. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat

betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het K.B. van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

3.1. Gevarencategorie: irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk

3.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het K.B. van 28/02/1994 en het K.B. van 11/01/1993 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan: Xi, N

3.3. De volgende R- en S- zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994:

3.3.1. R38-R43-R50/53

3.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S24-S37-S35-S61

3.4 De volgende CLP-etikettering conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Signaalwoorden: waarschuwing

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code: GHS07, GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen): H317, H410

Aanvullende informatie (EUH-zinnen): EUH401

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen): P280, P302+P352, P333+P313, P391

3.5. Aantal punten toegekend in toepassing van art.2bis §1 van het KB 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten:

4

3.6. Andere vermeldingen:

- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SP2 : Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

- SPe3: Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe8: Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken in de buurt van in bloei staand onkruid. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken. Het product moet dus toegepast worden vroeg in de morgen of laat in de avond.
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Aanvullingen op de CLP-etikettering:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- P280 : Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water gedurende 15 minuten wassen.

4. Algemene bepalingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

4.1. Geldigheidsduur van de toelating: vanaf 01/06/2019 tot en met 28/09/2019

4.2. Verkoop: /

5. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden:

Te behandelen:	Kersen- en kriekenbomen (open lucht)
Toepassingstadium:	vruchten hebben 90 % van hun eindgrootte bereikt - vruchten oogstrijp (BBCH 79-87)
Veiligheidstermijn:	7 dagen
Vijand:	<i>Drosophila suzukii</i>
Dosis:	0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Opmerking:	het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6
Risicobeperkende maatregelen:	bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

Te behandelen:	Pruimenbomen (open lucht)
Toepassingstadium:	vruchten hebben 90 % van hun eindgrootte bereikt - vruchten oogstrijp (BBCH 79-87)
Veiligheidstermijn:	7 dagen
Vijand:	<i>Drosophila suzukii</i>
Dosis:	0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Opmerking:	het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

Risicobeperkende maatregelen: bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

Risicobeperkende maatregelen:

Braamstruiken (onder bescherming)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

3 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

/

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

Risicobeperkende maatregelen:

Frambozenstruiken (onder bescherming)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

3 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

/

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

Risicobeperkende maatregelen:

Blauwe/ rode bosbessen (open lucht)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

3 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

Risicobeperkende maatregelen:

aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

3 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

3 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

Risicobeperkende maatregelen: bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

Risicobeperkende maatregelen:

kiwibes (open lucht)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

10 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

Risicobeperkende maatregelen:

druivelaars (tafeldruiven)(open lucht)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

10 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

Te behandelen:

Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:

Vijand:

Dosis:

Opmerking:

Risicobeperkende maatregelen:

druivelaars (voor wijnproductie)(open lucht)

eerste vruchten zichtbaar op trossenbasis - vruchten oogstrijp (BBCH 71-87)

10 dagen

Drosophila suzukii

0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen

het gebruik is beperkt tot bodems met een pH \geq 6

bufferzone van 20 m met minimum 99% driftreducerende techniek

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

ir Olivier GUELTON
Celhoofd Toelatingen