



DATE : 14/03/2024

## AUTORISATION D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE EN SITUATIONS D'URGENCE

Nom commercial :

**INTERCYP 0,8 GR**

Numéro d'autorisation :

**1333P/P**

Catégorie d'utilisateurs : exclusivement destiné à un usage **PROFESSIONNEL**

Détenteur de l'autorisation :

**ITICON**

Société anonyme

Pathoekeweg 9 boîte B1

8000 Brugge

Belgique

Nature du produit : **Insecticide**

Type de formulation : **GR (Granulé)**

Teneur garantie en substance(s) active(s), synergiste(s) et phytoprotecteur(s) :

- **Cyperméthrine : 8 g / kg (substance active)**

Les délais de grâce suivants sont d'application pour le produit :

- La mise sur le marché et la conservation par le détenteur de l'autorisation ne sont plus autorisés ;
- La mise sur le marché et la conservation par des tiers ne sont plus autorisés ;
- L'utilisation est autorisée **du 1<sup>er</sup> avril 2024 jusqu'au 30 avril 2024 inclus.**



Le nombre de points attribués pour le calcul de la contribution annuelle (en application de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits) :

**2**

Le produit, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions définies dans cet acte d'autorisation et son annexe, est autorisé en application :

- de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

La phrase suivante est uniquement d'application pour un acte établi au nom d'une firme étrangère :

cette autorisation n'est valable que pour autant que les noms et adresses des importateurs de ce produit en Belgique soient communiqués préalablement au Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants.

Cette autorisation n'engage pas la responsabilité de l'Etat en cas d'accidents dus à l'emploi du produit. Elle est délivrée sans préjudice des dispositions émanant du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement et du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ce qui concerne la fabrication et l'emploi de matières toxiques ou nocives.

Au nom du Ministre,



## **ANNEXE**

### **CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE DU PRODUIT**

Sans préjudice des dispositions relatives à la classification et l'étiquetage :

- du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- du Règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 08 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d' étiquetage de produits phytopharmaceutiques ;
- de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ;

les mentions suivantes doivent se trouver sur l'étiquette du produit :

#### **Classification et étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008**

Mention d'avertissement :

- ATTENTION

Classes et catégories de danger : /

Codes SGH et pictogrammes de danger :

- GHS09 : Dangereux pour l'environnement



Mentions de danger (phrases H) :

- H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (phrases P) :

- P280 : Porter des gants de protection.
- P284 : Porter un équipement de protection respiratoire.
- P391 : Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles sur les dangers (phrases EUH) :

- EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

#### **Phrases selon le Règlement (CE) n° 1107/2009 ou le Règlement (UE) n° 547/2011**

Phrases types indiquant les mesures de sécurité (phrases SP) :



- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- Spa1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 3A.
- Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.
- SPE3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- Spe5 : Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences doivent être entièrement incorporées dans le sol ; s'assurer que les semences sont également incorporées en bout de sillons.
- Spe6 : Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toute semence accidentellement répandue.
- Spe8 : Dangereux pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison de la culture (sauf pour les cultures dans lesquelles l'usage est autorisé aux stades de floraison BBCH 60-69). Ne pas utiliser en zone de butinage. Le produit doit être appliqué tôt le matin ou tard le soir

#### **Autres mentions/phrases nationales :**

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.



## **USAGES**

Les applications pour lesquelles le produit est autorisé et les conditions particulières d'application :

### **Chou-fleur (blanc et vert) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*)**

Localisation du traitement : plein air

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 20 mètres avec technique classique

Remarque :

- Max. 1 application/ culture
- Porter un équipement de protection respiratoire (masque filtrant les particules de type FFP2/P2) pendant le mélange et le chargement et l'application du produit.

**Pour lutter contre :**

**taupins (*Agriotes*)**

Dose :

12 kg/ ha

Nombre d'applications :

1

Méthode d'application :

couvrir les granulés au moment de la plantation

**Pour lutter contre :**

**mouche du chou (*Delia radicum*)**

Dose :

12 kg/ ha

Nombre d'applications :

1

Méthode d'application :

couvrir les granulés au moment de la plantation

### **Broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*)**

Localisation du traitement : plein air

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 20 mètres avec technique classique

Remarque :

- Max. 1 application/ culture
- Porter un équipement de protection respiratoire (masque filtrant les particules de type FFP2/P2) pendant le mélange et le chargement et l'application du produit.



**Pour lutter contre :** **taupins (*Agriotes*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation

**Pour lutter contre :** **mouche du chou (*Delia radicum*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation

**Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie) (*Brassica oleracea var. capitata*)**

Localisation du traitement : plein air

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 20 mètres avec technique classique

Remarque :

- Max. 1 application/ culture
- Porter un équipement de protection respiratoire (masque filtrant les particules de type FFP2/P2) pendant le mélange et le chargement et l'application du produit.

**Pour lutter contre :** **taupins (*Agriotes*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation

**Pour lutter contre :** **mouche du chou (*Delia radicum*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation

**Chou de Bruxelles (*Brassica oleracea var. gemmifera*)**

Localisation du traitement : plein air

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 20 mètres avec technique classique

Remarque :



- Max. 1 application/ culture
- Porter un équipement de protection respiratoire (masque filtrant les particules de type FFP2/P2) pendant le mélange et le chargement et l'application du produit.

**Pour lutter contre :** **taupins (*Agriotes*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation

**Pour lutter contre :** **mouche du chou (*Delia radicum*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation

**Chou Chinois, pakchoï en rosette et komatsuna (*Brassica rapa chinensis* & *B.rapa pekinensis*)**

Localisation du traitement : plein air

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 20 mètres avec technique classique

Remarque :

- Max. 1 application/ culture
- Porter un équipement de protection respiratoire (masque filtrant les particules de type FFP2/P2) pendant le mélange et le chargement et l'application du produit.

**Pour lutter contre :** **taupins (*Agriotes*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation

**Pour lutter contre :** **mouche du chou (*Delia radicum*)**  
Dose : 12 kg/ ha  
Nombre d'applications : 1  
Méthode d'application : couvrir les granulés au moment de la plantation



**Chou frisé (chou palmier) (*Brassica oleracea* var. *Sabellica*; *Brassica oleracea* var. *palmifolia*)**

Localisation du traitement : plein air

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 20 mètres avec technique classique

Remarque :

- Max. 1 application/ culture
- Porter un équipement de protection respiratoire (masque filtrant les particules de type FFP2/P2) pendant le mélange et le chargement et l'application du produit.

**Pour lutter contre :**

**taupins (*Agriotes*)**

Dose :

12 kg/ ha

Nombre d'applications :

1

Méthode d'application :

couvrir les granulés au moment de la plantation

**Pour lutter contre :**

**mouche du chou (*Delia radicum*)**

Dose :

12 kg/ ha

Nombre d'applications :

1

Méthode d'application :

couvrir les granulés au moment de la plantation

**Culture de racine de witloof (*Cichorium intybus* var. *Foliosum*)**

Localisation du traitement : plein air

Mesures de réduction du risque :

- Zone tampon de 20 mètres avec technique classique

Remarque :

- Porter un équipement de protection respiratoire (masque filtrant les particules de type FFP2/P2) pendant le mélange et le chargement et l'application du produit.

**Pour lutter contre :**

**taupins (*Agriotes*)**

Dose :

12 kg/ ha

Nombre d'applications :

1

Méthode d'application :

couvrir les granulés au moment du semis