



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 GENT

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES

1. Algemene bepalingen van de toelating

In toepassing van Verordening (EG) nr.1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en meer bepaald art. 53 betreffende afwijkingen in noodsituaties op het gebied van gewasbescherming, en overeenkomstig het advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, wordt het product:

TERRASAN (7762P/B)

met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten

als: nematicide / fungicide
op naam van: TAMINCO BVBA

2. Samenstelling en vorm

2.1. Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: 510 g/l METAM-NATRIUM

2.2. Formuleringstype: SL (Met water mengbaar concentraat)

3. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 547/2011 van 08/06/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het K.B. van 28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende vermeldingen op het etiket vermeld worden.

3.1. Gevarencategorie: corrosief, schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk

3.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage XIV van het K.B. van 28/02/1994 en het K.B. van 11/01/1193 tot regeling van de indeling en de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt brengen of het gebruik ervan:

C, N

3.3. De volgende R- en S- zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994:

3.3.1. R20/22-R31-R34-R43-R40-R48/22-R63-R50/53

3.3.2. S2-S13-S20/21-S26-S28-S36/37/39-S42-S45-S53-S60-S35-S61

3.4 De volgende CLP-etikettering conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Signaalwoorden: gevaar

Gevarenpictogrammen en hun GHS-code: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09



Gevarenaanduidingen (H-zinnen): H290, H302, H314, H317, H332, H351, H361, H373, H410

Aanvullende informatie (EUH-zinnen): EUH031, EUH210, EUH401

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen): P102, P201, P260, P263, P270, P272, P273, P280, P363, P391, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308-P311, P501

3.5. Aantal punten toegekend in toepassing van art.2bis §1 van het KB 14/01/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten:

10

3.6. Andere vermeldingen:

- Het product mag uitsluitend worden toegepast door houders van een fytolicensie "Specifiek professioneel gebruik voor metam-natrium".
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
- Spe1: Om de grondorganismen te beschermen mogen producten die de metabool MITC genereren, dus producten die metam-natrium of metam-kalium of dazomet bevatten, slechts eenmaal per 36 maanden op hetzelfde perceel worden toegepast.
- SPE2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.
- SPE3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet toepassen (zie risicobeperkende maatregelen).
- Tot 14 dagen na toepassing van het product moet een sperzone van 5 meter rond de behandelde oppervlakte of de behandelde serre gerespecteerd worden: het is verboden om de sperzone te betreden en waarschuwingsborden moeten worden geplaatst.

- Om de omwonenden, de voorbijgangers en de arbeiders te beschermen moet een bufferzone rond de woningen en de werkplaatsen gerespecteerd worden (zie rubriek "Opmerking" van elke teelt).
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
- Het product bezit aan de toegelaten doses een secundaire werking als herbicide.
- Om mogelijke hinder voor de toepasser en omwonenden te vermijden wordt het product bij voorkeur toegepast door bodeminjectie. Indien men toepast via de druppelirrigatiedarmen moeten deze op een 20-tal cm diepte ingegraven zijn. In dit laatste geval wordt de nodige hoeveelheid product toegepast als een constante verdunning.
- Niet toepassen bij bodemtemperaturen lager dan 10°C en hoger dan 20°C. De toepassing moet plaatsgrijpen in een bewerkte, fijn kruimelige bodem die vrij is van onverteerbare plantenresten en op vochtige grond.
- Zowel bij toepassing via bodeminjectie als bij toepassing via het druppelirrigatiesysteem moet de bodem worden afgedekt met gasdichte folie (VIF (Virtually Impermeable Film) of TIF (Totally Impermeable Film)). Voor toepassingen in open lucht moet de bodem tot 42 dagen na de toepassing worden afgedekt en voor toepassingen onder bescherming moet de bodem tot 14 dagen na de toepassing worden afgedekt.
- Bij toepassing in kassen, vrij van planten en dieren, moeten deze goed afsluitbaar zijn.
- De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Aanvullingen op de CLP-etikettering:

- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
- H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
- P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

4. Algemene bepalingen

Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de aanvraag of later verstrekte gegevens.

4.1. Geldigheidsduur van de toelating: vanaf 20/05/2018 tot en met 16/09/2018

4.2. Verkoop: /

5. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden:

Te behandelen:	druivelaars (tafeldruiven) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)

Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	braamstruiken (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	frambozenstruiken (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	blauwe / rode bosbessen (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	veenbessen (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september

Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	stekelbes (kruisbes) en kruisingen (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	tomaten (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	paprika/spaanse peper (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie

Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	komkommer (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	augurk (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	courgette/patisson (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	meloen (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	pompoen (onder bescherming)

Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	veldsla (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	slasoorten (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	spinazie (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen

Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	warmoes (snijbiet) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	dille (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels

Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	karwij (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie

Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	lavas, maggiplant (consumptie bladeren en/of stengels)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	roomse kervel (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)

Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	gewone bernagie (consumptie van de bloemen)
(onder	bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	rucola (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	zeekraal (consumptie bladeren en/of stengels)
(onder	bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	hysop (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand:	
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie

Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels)
Toepassingsstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	mint (consumptie bladeren en/of stengels)(onder bescherming)
Toepassingsstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/
Te behandelen:	marjolein/oregano (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
Toepassingsstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/

Te behandelen: **salie (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand: bodemschimmels
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **bonekruid (consumptie bladeren en/of stengels)(onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand: bodemschimmels
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **tijm (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand: bodemschimmels
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **rozemarijn (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand: bodemschimmels
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **laurier (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand: /
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **zuring (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand: /
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **postelein (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand: /
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)**
Toepassingsstadium: 3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn: /
Opmerking: - Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m².
- Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen bodemschimmels
Vijand: /
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand: aaltjes (nematoden)
Dosis: 5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen: /

Te behandelen: **courgette/patisson (open lucht)**

Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Bij toepassing door bodeminjectie en behandelde oppervlakte < of = 3 ha: bufferzone van 20 m rond woningen en werkplaatsen. - Bij toepassing door bodeminjectie en 3 ha < behandelde oppervlakte < of = 5 ha (maximum): bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen - Bij toepassing door druppelirrigatie en behandelde oppervlakte < of = 6400 m ² (maximum): bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen.
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	3 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie of druppelirrigatie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	3 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie of druppelirrigatie
Driftreducerende maatregelen:	Bufferzone van 10 m met klassieke techniek
Te behandelen:	radijs (onder bescherming)
Toepassingstadium:	3 weken voor het zaaien/planten - tussen april en september
Veiligheidstermijn:	/
Opmerking:	- Behandelde oppervlakte: maximum 6400 m ² . - Bufferzone van 30 m rond woningen en werkplaatsen
Vijand:	bodemschimmels
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Vijand:	aaltjes (nematoden)
Dosis:	5-7,5 l/are, 1 toepassing, door bodeminjectie
Driftreducerende maatregelen:	/

Algemene opmerking: /

De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

ir Olivier GUELTON
Celhoofd Toelatingen